ADAPTADOR® MIN

Acción.
Suplemento mineral inyectable para bovinos.

Composición.
Cobre (como edetato),1,0 g;
Zinc (como edetato), 4,0 g;
Manganeso (como edetato), 1,0 g;
Selenio (como selenito de sodio), 0,5 g;
Excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.
ADAPTADOR® MIN es una solución inyectable de microelementos que está indicada para la prevención y control del estrés oxidativo en terneros en el momento del destete, al inicio de un plan de inmunización y cuando los animales ingresan a un feedlot; también en otras situaciones que pudiesen generar la formación de radicales superóxido, como por ejemplo el transporte. **ADAPTADOR® MIN** también está indicado para la prevención y tratamiento de las carencias de los microelementos que esta solución contiene (cobre, zinc, selenio y manganeso). Los microelementos de **ADAPTADOR® MIN** y las vitaminas de **ADAPTADOR® VIT** representan en forma conjunta o aislada factores esenciales para la defensa antioxidante del organismo. Antes de iniciar protocolos de IATF (30 y 0 días antes de colocar los dispositivos). **En Vacas de tambo:** protocolo de aplicación Secado - Pre parto - Parto. Terneros que ingresan a guachera y o pasan a recría.

VITAMINICOS Y MINERALES

Dosis y vía administración.
La dosis aconsejada de **ADAPTADOR® MIN** es de 1 mL cada 50 kg de p.v. El intervalo entre dosis no debe ser inferior a 30 días.
Animales jóvenes (terneros/as) hasta 200 kg: 1 mL cada 50 kg de p.v.
Animales en recría (novillos y vaquillonas): 4 mL por animal como dosis total.
Animales adultos: vacas: 5 mL por animal como dosis total.
Toros: 6 mL por animal como dosis total. Aplicar por vía subcutánea con agujas 12/18. Se recomienda generar reserva hepática fetal tratando a las vacas con **ADAPTADOR® MIN** en el último tercio de la gestación, para evitar de esa forma las deficiencias de cobre y zinc en el ternero al pie de corta edad, ya que el tratamiento en esta categoría es difícil.

Periodo de retiro.
No posee.

Presentación.
Frasco de 500 mL.

Biogénesis Bagó