



ASPERSIN®



Acción.

Antiparasitario externo formulado a base de cipermetrina y clorpirifós. Esta combinación potencia mutuamente el efecto de ambos principios activos, dado el sinergismo que producen entre sí los piretroides y organofosforados. Su formulación especial para aspersión facilita un correcto mojado y la adherencia de los principios activos a la piel de los animales. Antisárnico, piojicida, insecticida y mosquicida bovino. Melofagucida ovino.

Composición.

Cipermetrina, 20 g; clorpirifós, 50 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.

Control y tratamiento de infestaciones provocadas por ácaros de la sarna bovina (*Psoroptes communis var. bovis*), piojos chupadores (*Linognathus spp*), piojos masticadores (*Damalinia spp*; *Bovicola spp*), melófagos (*Melophagus ovinus*), y una amplia gama de insectos hematófagos, moscas, tábanos, mosquitos y especialmente la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



Dosis y vías de Administración.

ASPERSIN® se aplica en baños de aspersión con bombas mecánicas o manuales, las cuales deben asegurar una presión adecuada para permitir el correcto asperjado de los animales. Insecticida, mosquicida y melofagucida: Se dosifica a razón de 1 L de ASPERSIN® en 1.200 L de agua, equivalente al contenido de una tapa de ASPERSIN® en 25 L de agua. En caso de disponer de un sistema recuperador de líquido, el refuerzo debe ser de 2 L cada 1.200 L de agua. Antisárnico bovino: Se dosifica a razón de 1 L de ASPERSIN® en 1.333 L de agua, equivalente al contenido de un frasco de 250 mL en 333 L de agua. Los animales deben ser perfectamente mojados en toda la superficie corporal, con especial atención a las lesiones y los pliegues de la piel. Se recomienda remover las costras de las lesiones sarnosas mediante frotación con cepillo antes de proceder al baño. Se debe aplicar dos baños con 10 a 12 días de intervalo entre ambos con el objeto de cortar el ciclo de la enfermedad.

Recomendaciones.

No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

Periodo de retiro.

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 17 días. Entre el último tratamiento y el ordeño para consumo humano y/o industrialización de la leche deben transcurrir 120 hs.

Presentación.

Frasco de 250 mL.