



# BAGOMETINA® STAR



### Acción.

Antiparasitario interno y externo para bovinos, que combate parásitos gastrointestinales, pulmonares, garrapatas, miasis cutáneas, moscas y piojos. Solución inyectable de ivermectina al 3,15%.

### Composición.

Ivermectina, 3,15 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

### Indicaciones.

**Parásitos gastrointestinales** (estadios inmaduros y adultos): *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia* spp, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus* (adultos), *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Oesophagostomum radiatum*, *Ostertagia lyrata*, *Ostertagia Teladorsagia ostertagi* (incluyendo estadios inhibidos), *Strongyloides papillosus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Toxocara vitulorum*.

**Parásitos pulmonares** (estadios inmaduros, inhibidos y adultos): *Dictyocaulus viviparus*.

**Garrapata:** *Rhipicephalus microplus*. Aprobado como garrapaticida bovino en la prueba biológica, con una eficacia del 99,09% y un poder residual absoluto de 17 días. Autorizado para su uso en zona de control y zona indemne, focos de reinfestación con la indicación del Programa Nacional de Lucha contra la Garrapata.

**Miasis cutáneas (estadios parasitarios):** *Dermatobia hominis* (ura), *Cochliomyia hominivorax* ("bichera" o "gusanera"), *Hypoderma* spp, *Chrysomya bezziana*, *Cochliomyia macellaria*.

**Piojos Chupadores:** *Haematopinus eurystemus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*.

**Control de miasis:** Miasis de ombligo: aplicar una dosis en las primeras 24 hs. de nacimiento.

**Miasis de castración:** aplicar una dosis simultáneamente con la castración.

### Dosis y vía de administración.

1 mL cada 50 kg de p.v. por vía subcutánea.

### Período de retiro.

No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 56 días desde el último tratamiento. No utilizar en hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización.