BAGOMECTINA®

Acción.
Antiparasitario interno y externo para bovinos, ovinos y porcinos, que combate los parásitos gastrointestinales, pulmonares, sarna, piojos, ura y miasis. Solución inyectable de ivermectina al 1%.

Composición.
Ivermectina, 1 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.

Bovinos. Parásitos internos. Parásitos gastrointestinales: *Bunostomum phlebotomum* (adultos, L3 y L4); *Cooperia oncophora* (adultos y L4); *Cooperia pectinata* (adultos y L4); *Cooperia punctata* (adultos y L4); *Cooperia spp* (adultos y L3); *Haemonchus placei* (adultos, L3 y L4); *Mecistocirrus digitatus* (adultos); *Nematodirus helvetianus* (adultos); *Nematodirus spathiger* (adultos); *Oesophagostomum radiatum* (adultos, L3 y L4); *Ostertagia (Teladorsagia) lyrata* (adultos y L4); *Ostertagia (Teladorsagia) ostertagi* (adultos, L3 y L4 incluyendo larvas inhibidas); *Strongyloides papillosus* (adultos); *Trichostrongylus axei* (adultos y L4); *Trichostrongylus colubriformis* (adultos y L4); *Toxocara vitulorum* (adultos).
Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, L4 y estados inhibidos).
Ectoparásitos. Sarna: Acariosis cutánea producida por *Psoroptes communis var. bovis*; *Sarcoptes scabiei var. bovis; Chorioptes bovis.*
Piojos chupadores: *Haematopinus eurysternus; Linognathus vituli; Solenopotes capillatus.*
Miasis: *Dermatobia hominis (ura); Hypoderma bovis; Hypoderma lineatum.* Como tratamiento coadyuvante en el control de piojos masticadores (*Damalinia bovis)*. Otros parásitos en los que la ivermectina ha mostrado actividad: *Parafilaria bovicola* (adultos); *Thelazia spp* (adultos); *Chrysomyia bezziana.*

Ovinos.
Parásitos internos. Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus contortus* (adultos, L3 y L4); *Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta* (adultos, L3 y L4); *Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata* (adultos y L4); *Trichostrongylus axei* (adultos); *Trichostrongylus vitrinus* (adultos); *Trichostrongylus colubriformis* (adultos, L3 y L4); *Nematodirus spathiger* (L3 y L4); *Nematodirus filicollis*; *Cooperia curticei* (adultos, L3 y L4); *Oesophagostomum venulosum* (adultos); *Oesophagostomum columbianum* (adultos, L3 y L4); *Chabertia ovina* (adultos, L3 y L4); *Thichuris ovis* (adultos); *Strongyloides papillosus* (L3 y L4); *Gaigeria pachyscelis* (adultos, L3 y L4).

ENDECTOCIDAS

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus filaria* (adultos); *Protostrongylus rufescens* (adultos).
Gusano de la cabeza: *Oestrus ovis* (todos los estadios larvales). Ectoparásitos.
Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis var. ovis; Sarcoptes scabiei var. ovis; Psorergates ovis.*

Porcinos. Parásitos internos. Parásitos gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos y L4); *Hyostrongylus rubidus* (adultos y L4); *Oesophagostomum spp* (adultos y L4); *Strongyloides ransomi* (adultos); *Trichuris suis* (adultos).
Parásitos pulmonares: *Metastrongylus spp* (adultos).
Parásitos del riñón: *Stephanurus dentatus* (adultos y L4). Ectoparásitos: Piojos: *Haematopinus suis*. Ácaros: *Sarcoptes scabiei var suis.*

Dosis y vía de administración.
Bovinos: 1 mL cada 50 kg de p.v. (200 mcg/kg) por vía subcutánea con una aguja 12/18.
Ovinos: 0,5 mL cada 25 kg de p.v. (200 mcg/kg) por vía subcutánea con una aguja 10/12, en la piel floja detrás de la paleta o en la ingle, en la cara interna del muslo.
Porcinos: 1 mL cada 33 kg de p.v. (300 mcg/kg) por vía subcutánea, en la piel laxa detrás de la oreja o en la ingle, en la cara interna del muslo.

Periodo de retiro.
Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir:
Bovinos: 35 días.
Ovinos: 35 días.
Porcinos: 18 días.

No aplicar en vacas lecheras en lactación ni dentro de los 28 días previos al parto cuando la leche se destine a consumo humano o industrialización. No utilizar en ovejas en lactación cuando la leche se destine a consumo humano o industrialización.

Presentación.
Frascos de 50 mL y 500 mL

Biogénesis Bagó