



BIO-CARBOGEN 2



Indicaciones.

Vacuna para la prevención del carbunco bacteridiano en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y equinos.

Composición.

Cada 100 mL contiene: 900 millones de esporos no capsulados avirulentos de *Bacillus anthracis*, cepa 34 F2 Sterne, excipientes, c.s.p. 100 mL.

Dosis y vía administración.

Bovinos y equinos: 2 mL.

Porcinos, ovinos y caprinos: 1 mL.

Vía: subcutánea.

Esquema de vacunación sugerido.

Primovacunación: Se debe vacunar a todo bovino mayor de 3 meses de vida. La vacunación de ovinos, caprinos y porcinos debe ser considerada cuando conviven con rodeos de bovinos donde se manifiesten casos de carbunco, y se vacunará sólo a los adultos. **Vacunaciones siguientes:** Revacunar a los 6 meses o 12 meses según la prevalencia de la enfermedad en el establecimiento. Para casos de los llamados "campos malditos" (alta infección telúrica), la revacunación debe ser repetida a los 6 meses. La fecha de vacunación debe ser estratégica en relación con la mayor casuística, que ocurre en verano; se recomienda por ende la vacunación en primavera.

Conservación.

Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz. No congelar.

Presentación.

Frascos de 100 mL y 250 mL.



**Biogénesis
Bago**