



BIOPOLIGEN® HS



Indicaciones.

Vacuna para la prevención del síndrome respiratorio en bovinos (complejo de enfermedades respiratorias, fiebre del transporte, neumonía) y cuadros reproductivos, neurológicos y entéricos asociados a la acción individual o combinada de los virus y bacterias presentes en la composición.

Composición.

Suspensión acuosa inactivada de herpesvirus bovino (BoHV) tipos 1 y 5, virus de la diarrea viral bovina (BVDV) tipos 1 y 2, virus de parainfluenza 3 (PI3), *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* e *Histophilus somni*.

Dosis y vía administración.

5 mL por vía subcutánea.

Esquema de vacunación sugerido:

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días. **Terneros de destete convencional (primovacunación):** Primera dosis: 45 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete. **Terneros de destete precoz:** Primera dosis: 30 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete. **Animales transportados (primovacunación):** Primera dosis: 45 días antes del transporte. Segunda dosis: 15 días antes del transporte. **Animales transportados (revacunación):** 15 días antes del transporte. **Animales que ingresan a invernada o feedlot:** Vacunar al ingreso; si no tienen antecedentes de vacunación previa, revacunar a los 15-21 días. **Vacas y vaquillonas gestantes:** Primera dosis: 60 días antes del parto. Segunda dosis: 30 días antes del parto.

Conservación.

Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz. No congelar.

Presentación.

Frascos de 125 mL y 250 mL.



**Biogénesis
Bagó**