

ANTIBIÓTICOS



CEFTIOMAX



Acción.

Solución antibiótica inyectable de amplio espectro para bovinos y porcinos.

Composición.

Ceftiofur base (como clorhidrato), 5 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.

Control de las infecciones bacterianas más comunes causadas por bacterias gram negativas y positivas. Indicado para uso en bovinos de cualquier edad y tipo de producción, incluso vaquillonas y vacas en producción láctea; y en porcinos, en lechones y cerdos de engorde y cría.

Bovinos: Tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (BRD), fiebre del embarque o neumonía bovina, asociada a *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*. Tratamiento de la necrobacilosis interdigital aguda (pododermatitis infecciosa, "foot-rot" o pododermatitis) asociadas a *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*. Tratamiento de la metritis aguda y de posparto asociadas a microorganismos sensibles al ceftiofur. **Porcinos:** Tratamiento y control de la enfermedad bacteriana de los cerdos (neumonía) asociada con *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis* tipo 2. Eficaz frente a infecciones por *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Haemophilus pleuropneumoniae*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis* y *S. bovis*.

Dosis y vía administración.

Bovinos: 1 a 2 mL cada 50 kg de p.v. por vía intramuscular o subcutánea.

Porcinos: 0,5-1 mL cada 10 kg de p.v. por vía intramuscular profunda exclusivamente. En ambas especies se debe repetir la dosis cada 24 hs. durante 3 días como mínimo. Queda a criterio del profesional actuante prolongar los tratamientos.

Periodo de retiro.

No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 2 días del último tratamiento. No posee periodo de retiro en cuanto a la leche.

Presentación.

Frasco de 100 mL.