

ANTIBIÓTICOS



ESTREPTOPENDIBEN® 5.000.000 UI



Acción.

Antibiótico inyectable de amplio espectro y antitérmico para bovinos y equinos. Asociación sinérgica bifásica de penicilina y estreptomicina con dipirona y vitamina C.

Composición.

Cada frasco con polvo contiene: penicilina sódica, 2.500.000 U.I.; penicilina benzatínica, 2.500.000 U.I.; estreptomicina (como sulfato), 2.000 mg; dipirona, 1.000 mg. Cada ampolla con solvente contiene: vitamina C, 1.100 mg; clorhidrato de lidocaína, 60 mg; excipientes, c.s.p. 16 mL.

Indicaciones.

Neumonías, bronconeumonías, neumoenteritis, nefritis, pielonefritis, cistitis, metritis, hepatitis, mastitis, septicemias, adenitis equina, absceso interdigital, actinomicosis, carbunco, tétanos, leptospirosis. También en todos los casos de infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la penicilina o estreptomicina.

Dosis y vía de administración.

10.000 a 20.000 U.I. de penicilina/kg de p.v., por vía intramuscular profunda que equivalen a 3,2 a 6,4 mL del producto reconstituido cada 100 kg de p.v., según la gravedad de la afección. Por lo general, una sola inyección es suficiente. Si persistieran los síntomas puede ser repetida la aplicación a las 24-48 hs.

Periodo de retiro.

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 30 días. Entre el último tratamiento y la utilización de la leche para consumo humano y/o industrialización deben transcurrir 4 días (8 ordeñes).

Presentación.

Cajas con 12 estuches. Cada estuche contiene una ampolla con polvo y una ampolla con el solvente.



**Biogénesis
Bagó**