



FIPROGEN

Acción:

Ectoparasitocida e insecticida pour on.

Composición:

Cada 100 mL contiene: fipronil 1 g.

Indicaciones: Garrapaticida, mosquicida y piojicida para Bovinos. Indicado para el tratamiento y control de garrapata (*Boophilus microplus*), ura/berne (*Dermatobia hominis*), mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y piojos (*Damalinia bovis*, *Linognathus vituli*). Auxilia en el control de la miasis (*Cochliomyia hominivorax*).

Dosis y vías de Administración:

Pour on. Aplicar 1 mL/10 kg p.v. (eq. a 1 mg de fipronil/kg p.v.). En predios con erradicación de R. microplus: utilizar cada 35 días. Aplicar sobre el dorso del animal, desde la nuca hasta la última vértebra lumbar.

Obs: Producto tóxico, Categoría Toxicológica II, Moderadamente peligroso (OMS). Leer cuidadosamente la etiqueta y manipular con precaución. En caso de intoxicación llamar al CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico), y acudir al médico con el envase del producto.



ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



Contraindicaciones - Precauciones:

Utilizar exclusivamente en bovinos de carne. No aplicar en animales mojados. Las precipitaciones inmediatas a su aplicación pueden disminuir la eficacia del producto. Evitar la sobredosisificación, especialmente en animales debilitados y estresados. No presenta contraindicaciones en vacas preñadas. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. En caso de contacto accidental y luego de utilizar el producto, lavar las manos y las partes expuestas con abundante agua y jabón. No beber, comer o fumar durante la manipulación del producto. Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, entre 5° y 35° C, protegido de la luz solar directa.

TE Carne: 200 días.

TE Leche: No administrar en animales en lactación, ni en el último tercio de la gestación.

Principio activo:

Fipronil

Presentaciones:

Bidones de 3 L.