



FORTIUM

Acción.

Antiparasitario interno y externo para equinos. Gel de amplio espectro que combina ivermectina y praziquantel para ser administrado por vía oral. De excelente palatabilidad y con facilidad de aplicación.

Composición.

Ivermectina, 1 g; praziquantel, 7,5 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.

FORTIUM está indicado para combatir los siguientes parásitos tanto en sus formas adultas como inmaduras. **Grandes estróngilos:** *Strongylus vulgaris* (adultos y estadios larvales arteriales); *Strongylus edentatus* (adultos y estadios tisulares); *Strongylus equinus* (adultos); *Triodontophorus* spp (adultos). **Pequeños estróngilos:** *Cyathostominae* (adultos y L4) de las siguientes especies: *Cyathostomum* spp; *Cylicocyclus* spp; *Cylicostephanus* spp; *Cylicodontophorus* spp; *Gyalocephalus* spp; *Poteriostomum* spp. **Otros parásitos internos:** *Parascaris equorum* (adultos, L3 y L4); *Oxyuris equi* (adultos y L4); *Trichostrongylus axei* (adultos); *Strongyloides westeri* (adultos); *Habronema muscae* (adultos); *Habronema majus* (adultos); *Anoplocephala perfoliata*; *Anoplocephala magna*; *Paranoplocephala mamillana*. **Parásitos del cuajo:** *Gasterophilus nasalis* (L2 y L3). **Parásitos pulmonares:** *Dictyocaulus arnfieldi*. **Habronemosis cutánea (llagas de verano)** causadas por: *Habronema muscae*; *Habronema majus*; *Draschias* spp en sus estadios larvales cutáneos L3. **Dermatitis causadas por filáridos (microfilariae):** *Onchocerca cervicalis*. **Garrapatas:** Ayuda en el control de *Amblyomma cajenense* y *Dermacentor nitens*.

Dosis y vía de administración.

1 g cada 50 kg de p.v. (200 mcg de ivermectina/kg de p.v. y 1,5 mg/kg de p.v. de praziquantel). Administrar exclusivamente por vía oral. Para una correcta administración del producto, calibrar la jeringa dosificadora de acuerdo al peso del animal a tratar.

ENDECTOCIDAS



Instrucciones de uso.

Abrir la boca del animal colocando los dedos sobre el morro y el pulgar sobre el paladar ejerciendo una suave presión. Retirar la tapa de la cánula e introducir la jeringa en la boca buscando dejar la cánula sobre la base de la lengua, luego apretar el émbolo suavemente. El equino saboreará la esencia y deglutirá el gel. Evitar la administración en forma enérgica para disminuir la posibilidad de falsa vía.

Seguridad.

A la dosis indicada, puede ser administrado en equinos de todas las edades, incluso en yeguas en cualquier estado de preñez. La fertilidad y la calidad del semen de los padrillos no se ven afectadas. No tiene efecto teratogénico.

Periodo de retiro.

No destinar los animales tratados al consumo humano hasta transcurridos 14 días del último tratamiento.

Presentación.

Frasco multidosis de 240 g.