



FOSFAMISOL® M.V



Acción.

Antiparasitario interno inyectable de amplio espectro para bovinos.

Composición.

Fosfato de L-tetramisol, 22,3 g; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones. Antiparasitario interno eficaz contra los parásitos gastrointestinales y pulmonares de los bovinos. Actúa principalmente contra los nematodos adultos y en menor proporción contra formas larvarias. El Levamisol no es ovicida.

Dosis y vía de administración.

1 mL cada 22,5 kg de p.v. (8 mg/kg de p.v.). Por vía subcutánea (SC), intrarruminal (IR) o intraperitoneal (IP). **Vía subcutánea:** Aplicar en la tabla del cuello o detrás de la paleta con aguja 12/18. **Vía IR/IP:** Aplicar en el flanco izquierdo con aguja 20/20 según el tamaño del animal. La vía IR/IP está específicamente indicada para su utilización en periodos estivales, pues de esta forma se eliminan posibles reacciones locales. La inoculación por el flanco izquierdo en animales con rumen poco desarrollado no tiene contraindicaciones, ya que puede emplearse por vía intraperitoneal.

Periodo de retiro.

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 7 días. No administrar a hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización.

Presentación.

Frasco de 500 mL.