



## ROTATEC J5®



### Indicaciones.

Vacuna para la prevención del síndrome de la diarrea neonatal del ternero causado por rotavirus bovino y bacterias gram negativas; endotoxemias secundarias a infecciones por bacterias gram negativas y mastitis por coliformes en vacas de tambo.

### Composición.

Emulsión oleosa inactivada de rotavirus bovino serotipos 6 y 10 y *Escherichia coli* J5.

### Dosis y vía administración.

3 mL vía intramuscular o subcutánea, en la tabla del cuello.

### Esquema de vacunación sugerido:

**Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez):** 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días. **Rodeos de cría. Vacas y vaquillonas (primovacunación):** Primera dosis: séptimo mes de preñez. Segunda dosis: octavo mes de preñez. **Vacas y vaquillonas (revacunación):** Aplicar una dosis al octavo mes de preñez. Se sugiere en rodeos con alta incidencia: primera dosis séptimo mes de preñez, segunda dosis octavo mes de preñez y una tercera dosis a las vacas cola de parición. **Tambo. Vacas y vaquillonas (primovacunación):** Primera dosis: séptimo mes de preñez. Segunda dosis: octavo mes de preñez. **Vacas y vaquillonas (revacunación):** Primera dosis: secado. Segunda dosis: parto. **Para prevención de mastitis coliforme aplicar una tercera dosis al parto.**

### Conservación.

Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz. No congelar.

### Presentación.

Frascos de 120 mL y 240 mL.